


## Gebrauchsinformation

### Pharmazeutischer Unternehmer / Hersteller

Deutsche Homöopathie-Union  
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG  
Ottostraße 24  
76227 Karlsruhe  
www.dhu.de



# Metrovetsan®

Mischung für Pferde, Rinder, Schafe, Ziegen, Hunde, Katzen

Homöopathisches Arzneimittel für Tiere

### Zusammensetzung

10 g (entsprechend 10,7 ml) Mischung enthalten:

*Wirkstoffe:* Pulsatilla Dil. D2 0,1 g, Sepia officinalis purificata Dil. D4 (HAB, V.4b) 0,1 g.

*Sonstige Bestandteile:* Ethanol 94% (m/m), Gereinigtes Wasser.

### Anwendungsgebiete

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den veterinär-homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören:

- chronische Gebärmutterentzündung (Endometritis) I. und II. Grades
- Erzeugung einer therapeutischen Hyperämie im Genitaltrakt bei Sterilität ohne klinischen Befund
- unterstützend bei der offenen Form der Gebärmuttervereiterung (Pyometra) der Hündin
- Regulierung hormonell bedingter Dysfunktion
- Beschleunigung der Gebämmutterrückbildung (Uterusinvolution) nach Kaiserschnitten
- bei Verzögerung der Reinigung nach der Geburt und nach Nachgeburtsverhaltung (Retentio secundinarum)

### Gegenanzeigen

Metrovetsan® darf nicht angewendet werden bei:

- der geschlossenen Form der Gebärmuttervereiterung (Pyometra) der Hündin
- Welpen und Jungtieren
- einer bekannten Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe des Arzneimittels

### Nebenwirkungen

Keine bekannt.

Falls Sie eine Nebenwirkung bei Ihrem Tier feststellen, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt ist, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

### Hinweis:

Bei der Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Tierarzt befragen.

### Zieltierarten

Pferde, Rinder, Schafe, Ziegen, Hunde, Katzen.



## Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Zum Eingeben oder zum Eingeben über das Futter bzw. Trinkwasser.

Pferd:	15 Tropfen p.o.
Rind:	15 Tropfen p.o.
Schaf:	10 Tropfen p.o.
Ziege:	10 Tropfen p.o.
Hund:	5 – 10 Tropfen p.o.
Katze:	3 – 5 Tropfen p.o.

Die Einzeldosis sollte 3- bis 5-mal täglich eingegeben werden.

Sobald eine Besserung der Beschwerden eintritt, kann die Häufigkeit der Arzneigaben reduziert und bei Beschwerdefreiheit abgesetzt werden.

Auch homöopathische Medikamente sollten ohne tierärztlichen Rat nicht über längere Zeit verabreicht werden.

### Wartezeit

Pferd, Rind, Schaf, Ziege:	Essbare Gewebe:	0 Tage
	Milch:	0 Tage

### Besondere Lagerungshinweise

Arzneimittel sollen für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden!

Nicht über 25 °C lagern.

Das Arzneimittel nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfallsdatums nicht mehr anwenden.

### Besonderer Warnhinweis

Vor der Anwendung von Metrovetsan<sup>®</sup> sollten die Erkrankung und ihre Ursachen tierärztlich abgeklärt sein. Die Anwendung ersetzt nicht andere vom Tierarzt diesbezüglich verordnete Arzneimittel. Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden, insbesondere bei Fieber oder schweren Störungen des Allgemeinbefindens, sollte tierärztlicher Rat eingeholt werden.

Hinweis: Enthält 50 Vol.-% Alkohol.

### Anwendung während der Trächtigkeit und der Laktation

Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Trächtigkeit und Laktation nur nach Rücksprache mit dem Tierarzt angewendet werden.

### Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Während der Anwendung von Metrovetsan<sup>®</sup> sollte keine Uterusspülung mit jodhaltigen Lösungen durchgeführt werden. Falls erforderlich kann die Spülung 8 Tage nach Abschluss der Behandlung vorgenommen werden.

Die gleichzeitige Gabe eines unverträglichen Arzneimittels, welches die Wirkung von Metrovetsan<sup>®</sup> aufheben könnte, ist zu vermeiden. Fragen Sie dazu Ihren Tierarzt.

### Datum der Fassung der Packungsbeilage

Juli 2007

### Darreichungsform und Packungsgrößen

Originalpackung mit 50 ml Mischung

Apothekenpflichtig

Zul.-Nr.: 6402678.00.00